

DESCRIPTIONS DE BUPRESTIDES NOUVEAUX

par **Ch. Kerremans.**

[Les livraisons 9-10 du tome VII de la *Monographie des Buprestides* venaient de paraître (juillet 1914) et notre regretté collègue, CH. KERREMANS, avait déjà remis entre les mains de son imprimeur un important manuscrit comportant la suite de cette Monographie, quand la guerre vint soudain en arrêter l'impression...

Le manuscrit achevé par KERREMANS comprenait les descriptions d'un certain nombre d'espèces nouvelles. La publication de cette partie de la Monographie devant probablement tarder encore quelque peu, la *Société Entomologique de Belgique* a pensé, d'accord avec M^{me} KERREMANS, qu'il y avait intérêt à publier dans ses *Annales* ces descriptions, afin d'assurer à son regretté Président la priorité des espèces étudiées par lui. Une série de diagnoses d'espèces africaines paraît simultanément dans la *Revue Zoologique Africaine*. — H. SCHOUTEDEN.]

1. — HIPPOMELAS AENEOCUPREA nov. sp.

Long. 23 ; larg. 8,5 mill.

Oblong ovale, assez convexe, atténué en avant et subacuminé en arrière, entièrement cuivreux pourpré sombre avec l'extrémité des élytres plus obscure, presque noire.

Rappelle, par la forme du corps, les formes des *Prasinalia*, mais d'un aspect plus robuste, avec les antennes et les tarses écourtés des *Hippomelas s. s.*

Tête large, concave en avant, couverte de gros reliefs irréguliers entre des points inégalement espacés; antennes courtes, le 3^e article un peu plus long que le 4^e, les articles dentés à côtés non parallèles. Pronotum en trapèze, 5/8 fois aussi long que large; faiblement bisinué en avant et fortement en arrière; les côtés subparallèles et subsinueux en arrière et arrondis et confluent en avant; la surface couverte de points inégalement espacés entre ses reliefs vermiculés, subtransversaux et plus saillants quoique moins larges sur les côtés. Ecusson très petit, un peu transversal. Elytres obliquement atténués en ligne droite depuis l'épaule jusque vers le quart postérieur, ensuite obliquement atténués en arc jusqu'au sommet; celui-ci obliquement tronqué de part et d'autre et inégalement denté; la surface un peu plus rugueuse que chez l'*H. mexicana*, mais ayant la même

structure. Dessous couvert de reliefs vermiculés inégaux entre des points irréguliers; pattes médiocres; tarses plus courts que les tibias, le premier article des postérieurs sensiblement plus long que le suivant.

HAB. — Mexique : San José.

2. — *H. DELICIOSA* nov. sp.

Long. 22 ; larg. 7 mill.

Taille et faciès de l'*H. blanda* FAB., dont il ne rappelle que la forme du corps, tout à fait différent de celui-ci par l'aspect lisse et brillant du dessus, par la coloration et par la sculpture élytrale.

Subovalaire, atténué en avant et acuminé en arrière, sa plus grande largeur au tiers postérieur; tête et pronotum pourpré éclatant, la première avec le bord des yeux, l'épistome et une étroite ligne antéro-médiane vert clair, le second avec la marge antérieure très étroitement, les côtés un peu plus largement et le fond de la fossette préscutellaire vert clair; écusson vert clair; élytres noir verdâtre brillant à léger reflet pourpré avec de part et d'autre six impressions et une tache épipleurale finement pointillées et d'un beau vert clair, la première, irrégulière, à la base, la deuxième, arrondie, au tiers antérieur, plus près de la suture que du côté, la troisième un peu plus large que la précédente, située un peu en deça du milieu et un peu plus près du bord externe que de la suture, la quatrième et la cinquième situées au quart postérieur, toutes deux à la même hauteur, l'une près d'une côte prémarginale, l'autre entre une courte côte terminale et la suture, la sixième enfin allongée le long de la suture, vers le sommet; dessous entièrement d'un beau vert clair, très brillant, les tibias et les tarses bleu verdâtre.

Tête à ponctuation dense et inégalement espacée, plus épaisse en avant et plus fine en arrière, front sillonné, peu profond et élargi en avant, linéaire en arrière et prolongé sur le vertex. Pronotum un peu plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière, sa plus grande largeur un peu après le milieu; la marge antérieure étroitement rebordée et subsinueuse; les côtés obliques en avant, arrondis un peu après le milieu, convergents et subsinueux en arrière avec l'angle postérieur aigu et saillant en dehors, la marge latérale creusée en gouttière; le milieu du disque longitudinalement sillonné, le sillon linéaire en avant et terminé en fossette au dessus de l'écusson; de chaque côté, contre la base et près de l'angle postérieur, une fossette assez profonde; la surface lisse et très luisante, couverte de points fins

assez largement et assez régulièrement espacés, un peu plus épais et plus rapprochés sur les côtés. Ecusson petit, en trapèze atténué en avant, impressionné au milieu. Elytres arrondis à l'épaule, légèrement cintrés en dedans au tiers antérieur, élargis et arrondis au tiers postérieur, atténués en ligne droite et dentelés jusqu'au sommet; la surface brillante et lisse avec une très fine ponctuation disposée en séries linéaires; les impressions comme il est dit ci-dessus; une côte prémarginale externe, une côte sinueuse naissant entre la quatrième et la cinquième et rejoignant la prémarginale au sommet; la suture élevée depuis le tiers postérieur jusqu'à l'apex. Dessous brillant, finement et densément ponctué, les points encore plus fins et plus rapprochés dans les fossettes latérales des segments abdominaux.

HAB. — Pérou (ma coll., type !).

3. — *H. PERFECTA* nov. sp.

Long. 16-19; larg. 5,5-6,5 mill.

Ressemble au précédent pour la forme du corps et pour le dessin élytral, mais moins robuste, différent par le mode de coloration.

Tête vert doré avec le vertex et sur le front deux lignes parallèles pourpré sombre; pronotum noir avec un léger reflet pourpré, les bords vert doré et trois lignes longitudinales vert doré, les deux latérales étroitement lisérées de part et d'autre de cuivreux pourpré; élytres noirs à léger reflet pourpré avec des fossettes et des taches exactement placées comme celles de l'espèce qui précède, mais relativement un peu plus grandes, et vert doré, dessous vert clair, un peu plus sombre.

Tête à ponctuation plus épaisse, avec le sillon médian moins profond et moins élargi en avant. Pronotum un peu plus allongé avec le sillon médian moins prononcé, terminé par une fossette arrondie et plus petite; les fossettes latérales semblables, la ponctuation discale un peu plus forte et plus rapprochée. Ponctuation élytrale un peu plus épaisse, les côtes semblables. Dessous à ponctuation un peu plus forte et plus dense.

HAB. — Colombie (ma collection, type !).

4. — *IRIDOTÆNIA LÆVIS* nov. sp.

Long. 23; larg. 7 mill.

Assez voisin de *I. purpurea* CAST. et GORY, mais le pronotum plus allongé et plus étroit en avant, la tête plus petite, mais les

yeux plus épais et plus saillants en dehors, la coloration générale différente et plus claire, l'aspect du dessus plus lisse.

Allongé, atténué en avant et en arrière, tête, pronotum et antennes bronzé cuivreux clair, élytres bronzé verdâtre clair, la suture et le sommet plus franchement vert clair, moins bronzés que le disque; dessous et pattes vert, le milieu du sternum et du premier segment abdominal cuivreux.

Tête rugueuse, à reliefs vermiculés longitudinaux; front largement creusé. Pronotum en trapèze, un peu plus large que long, beaucoup plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure avancée avec une petite échancrure médiane; les côtés obliquement convergents vers le sommet en ligne presque droite jusqu'au sommet où se marque un bourrelet transversal; le milieu du disque sillonné, les côtés impressionnés de part et d'autre contre la base dans l'angle postérieur et à une certaine distance du bord; la surface lisse et couverte d'une ponctuation fine largement et inégalement espacée. Ecusson très petit, bronzé cuivreux clair. Elytres arrondis à l'épaule, irrégulièrement impressionnés le long de la base, très légèrement divergents en ligne droite depuis la base jusqu'au tiers postérieur, atténués ensuite en arc jusqu'au sommet; celui-ci dentelé sur les côtés et terminé en pointe aiguë; le calus huméral saillant; une courte côte oblique naissant du sommet pour finir un peu au delà; la surface couverte de points très fins, vaguement disposés en séries longitudinales; quelques rides sur les côtés, sous le calus huméral. Dessous très finement et très densément pointillé; saillie prosternale élargie et creusée en arrière; extrémité du dernier segment abdominal étroitement échancrée en angle aigu (σ); pattes longues et grêles; les tibias antérieurs (σ) très arqués.

HAB. — Ile Nias (ma collection, type).

5. — CHRYSODEMA FURCATA nov. sp.

Long. 27; larg. 9,5 mill.

Du groupe des *Pseudochrysodema* SAUND.

Voisin de *C. fuscitarsis* KERREM., mais moins allongé, plus robuste, plus élargi à l'épaule, plus convexe, les côtes élytrales plus épaisses, les impressions qui les limitent plus profondément creusées.

Ovalaire, très convexe, atténué en avant et en arrière, entièrement d'un vert bleuâtre très obscur avec les côtes élytrales bronzé presque noir, les antennes noires et les tarses testacés. Tête largement et profondément excavée, subgranuleuse et

inégaleinent ponctuée, l'excavation étroitement sillonnée dans le fond. Pronotum presque deux fois aussi large que long, plus étroit en avant qu'en arrière, la marge antérieure faiblement, la base plus sensiblement mais plus largement bisinuée; les côtés obliquement et régulièrement arques; des deux côtes, dans l'angle antérieur, une large et profonde fossette arrondie, dorée et finement pointillée, dont le bord extérieur forme une carène surplombant la carène marginale, celle-ci interrompue par un sillon transversal, court et formant du bord antérieur une sorte de collier; le milieu du disque caréné; la surface couverte d'une ponctuation assez dense, irrégulièrement espacée entre quelques vagues reliefs bronzés peu accentués. Ecusson très petit, carré, légèrement déprimé. Élytres obliquement tronqués à l'épaule, la partie inférieure de la troncature en saillie dentiforme obtuse, ensuite légèrement convergents en ligne droite jusqu'au tiers postérieur, puis atténués en arc et dentelés jusqu'au sommet; la suture élevée et lisse, vaguement et irrégulièrement ponctuée, deux côtes discales et fortes, la première entière et se joignant en forme de fourche, vers le quart postérieur, à la deuxième qui naît sous le calus huméral; une troisième côte, naissant sous le calus, rejoint la deuxième avant la jonction de celle-ci avec la première; une quatrième côte enfin, prémarginale, moins épaisse que les précédentes, longe le bord à une courte distance de celui-ci; les espaces compris entre ces côtes sont très finement et très densément pointillés en arrière, et moins finement ponctués en avant entre des reliefs vermiculés et transversaux. Dessous finement ponctué, la ponctuation très fine et très dense et cuivreuse dans de larges dépressions sur les côtés et à la base des segments abdominaux; milieu du prosternum profondément sillonné; partie antéro-médiane du métasternum et milieu du premier segment abdominal largement excavés; extrémité du dernier segment abdominal (♂) étroitement et profondément échancrée en angle aigu; pattes robustes; farses testacés.

HAB. — Australie : Rockhampton (ma coll., type!).

6. — *C. GLORIOSA* nov. sp.

Long. 31 ; larg. 10,5 mill.

Oblong ovale, allongé, d'un cuivreux clair éclatant à reflets verts en dessus avec la tête un peu plus verte, les deux premiers articles des antennes verts, les autres noir mat. Dessous d'un cuivreux plus rouge, les côtés à reflets verts et les pattes vertes à reflets cuivreux; farses verts.

Rappelle, mais de très loin, le *C. Mnischeki* H. DEYR., avec les élytres moins acuminés en arrière, les côtes élytrales beaucoup plus vagues et moins régulières, les impressions du pronotum moins grandes et plus transversales, la coloration tout autre.

Tête médiocre, largement et peu profondément creusée, avec un sillon net, profond, interrompu en avant et prolongé en arrière, sur le vertex, suivant une ligne très fine. Pronotum en trapèze, une peu moins de moitié aussi large que long, atténué en avant, à peine sinué en arrière; les côtés obliquement et faiblement arqués; le milieu du disque faiblement caréné; une impression transversale de chaque côté dans les angles postérieurs; la surface couverte de points inégalement espacés entre de très vagues reliefs lisses, ces points et ces reliefs plus accentués sur les côtés. Ecusson petit, rectangulaire, un peu plus large que long. Elytres tronqués à la base, arrondis à l'épaule, légèrement sinués à hauteur des hanches postérieures, à peine élargis au tiers supérieur, atténués ensuite en arc et dentelés jusqu'au sommet; la suture et quatre côtes larges mais peu saillantes; la première et la deuxième réunies en une seule vers le sommet, la troisième subsinueuse, naissant sous le calus huméral et ramifiée vers la deuxième avant la jonction de celle-ci avec la première, la quatrième prémarginale et parallèle au bord, toutes peu saillantes et vagues; leurs intervalles finement et densément pointillés sur la moitié inférieure, plus grossièrement sur l'antérieure entre de larges vermiculations peu saillantes. Dessous lisse, à points espacés au milieu, plus fins et plus rapprochés sur les côtés; milieu du prosternum plan, grossièrement ponctué; milieu du premier segment abdominal impressionné à la base; extrémité du dernier segment abdominal (♀) en ogive avec une très petite échancrure anguleuse; pattes assez robustes.

HAB. — Célèbes (ma coll., type!).

7. — *C. CORIACEA* nov. sp.

Long. 25-28 ; larg. 8,5-10 mill.

Robuste, écourté, convexe, atténué en avant et acuminé en arrière, toutes les parties en relief du dessus noires, les impressions et la ponctuation vert doré ou cuivreux; dessous plus clair, vert doré ou vert émeraude, la ponctuation fine des impressions cuivreuse ou dorée.

Faciès de *Chr. antennata* SAUND., mais plus trapu, plus convexe, avec la ponctuation élytrale beaucoup plus grosse et les reliefs plus épais, les côtes bien marquées.

Tête creusée, avec un sillon dans le fond de l'excavation n'atteignant ni l'épistome ni le vertex; les antennes couvertes, sur les articles dentés, de longs poils dressés et rares. Pronotum plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure subsinueuse, sensiblement échanerée en arc; les côtés arrondis en avant et parallèles en arrière; la base presque tronquée; le milieu du disque caréné; les fossettes latérales peu marquées, sans forme déterminée, constituées par des amas pointillés et cuivreux; la surface couverte de larges empâtements vermiculés entre des points inégalement espacés, plus denses et plus fins le long de la carène médiane et, transversalement le long du bord antérieur à une certaine distance de celui-ci, sur les côtés et au dessus de la fossette usuelle. Elytres obliquement élargis à l'épaule, très légèrement divergents en ligne droite jusqu'au tiers postérieur, peu arqués ensuite, obliquement atténués et dentés jusqu'au sommet; la surface couverte, entre les quatre côtes usuelles bien marquées mais peu saillantes, de reliefs vermiculés épais et se ramifiant avec les côtes. Dessous finement et irrégulièrement ponctué, la ponctuation beaucoup plus forte et beaucoup plus dense dans les dépressions et le long de la base des segments abdominaux; milieu du prosternum largement canaliculé; partie antérieure du milieu du métasternum et du premier segment abdominal profondément creusée; extrémité du dernier segment abdominal en ogive (♀) ou très étroitement échanquée (♂); pattes normales.

HAB. — Ile Samar (ma coll., type!).

8. — *C. DIVERSA* nov. sp.

Long. 28 ; larg. 8,5 mill.

Oblong ovale, allongé, peu convexe, d'un vert sombre, légèrement bleuâtre en dessus avec les fossettes du pronotum dorées; dessous vert émeraude brillant avec les côtés de l'abdomen et les tarses d'un vert plus clair.

Se rapproche de *Chr. revisa* GEMM. et HAR. pour la faible accentuation des reliefs élytraux, mais différent de celui-ci par la présence de quatre côtes aplanies et par les fossettes du pronotum beaucoup plus superficielles.

Tête formée de deux excavations superposées dont l'antérieure plus profonde que la postérieure, en est séparée par un talus arqué, et traversées dans leur longueur par un sillon net et profond qui devient fin et linéaire en se prolongeant sur le vertex. Pronotum en trapèze, un peu plus large que long, plus étroit en avant qu'en arrière, plus sensiblement bisinué le long de la

marge antérieure que de la base; les côtés obliquement arqués et légèrement renflés par le rebord des fossettes; le milieu du disque caréné; les fossettes latérales peu profondes, leur plan incliné vers l'extérieur où elles sont limitées par un rebord saillant surplombant la carène marginale, leur fond irrégulièrement ponctué et faisant une saillie arrondie au côté externe; la surface couverte de points ronds inégalement espacés avec quelques vagues reliefs peu accentués. Elytres arrondis à l'épaule, très légèrement divergents en ligne droite jusqu'au tiers postérieur, atténués ensuite en ligne droite et dentelés jusqu'au sommet; la surface finement et inégalement ponctué sans autres reliefs que quatre côtes noirâtres, presque planes, couvertes de points un peu plus épais que ceux du fond, et très inégalement répartis. Dessous couvert d'une ponctuation irrégulière, subaciculée sur l'abdomen, plus fine, plus dense dans les dépressions latérales des segments abdominaux; milieu du prosternum sillonné; le fond du sillon inégalement et grossièrement ponctué; métasternum largement et peu profondément creusé; milieu du premier segment abdominal déprimé; pattes normales.

HAB. — Amboine (ma coll., type!).

9. — *C. PALLIDA* nov. sp.

Long. 29 ; larg. 9,5 mill.

Allongé, atténué en avant et acuminé en arrière, très peu convexe, d'un bronzé brun très clair en dessus avec les reliefs noirs, ceux des élytres minces et linéaires; dessous plus cuivreux.

Ressemble beaucoup aux exemplaires femelles de grande taille du *C. liberta* GERMAR, mais tout à fait différent de ceux-ci par l'allongement du corps, qui est plus acuminé en arrière, par l'étroitesse des reliefs linéaires des élytres et par la coloration constante du dessus, non cuivreuse, d'un bronzé brun clair dans les dépressions.

Tête à peu près semblable, mais autrement vermiculée de reliefs plus fins le long des yeux; pronotum relativement plus long, à côtés postérieurs un peu plus sinueux mais à sculpture identique; élytres plus atténués en ligne droite du tiers postérieur au sommet, tous les reliefs plus minces et surtout la suture, mais ayant la même allure. Reliefs du dessous plus nombreux et plus minces; carène médiane du prosternum moins nette et moins entière, interrompue en arrière.

HAB. — Colombie britannique (ma coll., type).

10. — PARACUPTA GLAUCA nov. sp.

Long. 37 ; larg. 13 mill.

Facies et taille de *P. helopioides* BOISD., mais le dessus un peu plus convexe, le pronotum un peu moins allongé et moins atténué en avant, a ponctuation discale plus épaisse et plus rapprochée, la coloration plus mate, moins métallique.

Tête cuivreuse; antennes testacé clair; pronotum et élytres d'un vert clair, un peu glauque, mat, non métallique, l'extrême apex cuivreux. Dessous vert doré clair, brillant et métallique; les tarses testacé clair, leur dernier article brun obscur.

Tête largement excavée, l'excavation limitée de part et d'autre par une carène longeant les yeux et prolongée en avant en y formant les bords des cavités antennaires, le fond de l'excavation finement pointillé et longitudinalement caréné, la carène très fine et linéaire; le vertex plus fortement ponctué que l'excavation. Pronotum en trapèze, $\frac{3}{5}$ fois plus large que long, échancré en arc en avant; les côtés régulièrement arqués et convergents vers l'avant; la base faiblement bisinuée; le disque largement sillonné, le sillon plus large et moins profond, à fond rugueusement vermiculé, longe de part et d'autre la marge latérale à une certaine distance de celle-ci, le milieu du disque à ponctuation assez forte mais largement et très inégalement espacée; les côtés très rugueux et très grossièrement ponctué; contre la base, entre le sillon médian et les sillons prélatéraux, une courte impression oblique située dans le prolongement du premier espace intercostal des élytres. Ecusson petit, enfoncé, presque carré. Elytres présentant la même structure que celle du *P. helopioides*, mais les côtes moins larges et les espaces intercostaux plus rugueux. Le dessous semblable, mais d'un vert plus clair et plus doré.

HAB. — Iles Salomon (ma coll., type!).

11. — P. CUPRICOSTATA nov. sp.

Long. 31 ; larg. 10 mill.

Voisin de *P. helopioides* pour le faciès, mais moins robuste, moins convexe, plus régulièrement elliptique, tout à fait différent par les côtes élytrales plus nettes, plus saillantes et plus étroites et par les espaces intercostaux plus larges, plus finement et plus régulièrement granuleux.

Tête et pronotum cuivreux, le sillon médian du second et les fonds des côtés ainsi que les points d'un vert clair et mat; le premier article des antennes cuivreux obscur; le fond des élytres

d'un beau vert clair peu métallique, les côtes d'un cuivreux brillant; dessous vert cuivreux; tarsi cuivreux obscur.

Tête semblable à celle des espèces du même groupe, mais avec le vertex plus densément et plus grossièrement ponctué. Pronotum plus rugueux, plus grossièrement vermiculé sur les côtés, le sillon médian plus large, finement et très densément ponctué; les sillons latéraux moins nets, ne formant plus qu'une faible dépression à reliefs vermiculés. Elytres avec la suture, la marge latérale et quatre côtes cuivreuses et une très courte, plus mince, située vers la base et dans le deuxième espace intercostal. Ceux-ci larges, peu profonds, finement et très régulièrement pointillés avec quelques vestiges de reliefs cuivreux. Dessous semblable à celui des espèces du même groupe, mais à ponctuation un peu plus forte et plus dense, le milieu du prosternum et celui du premier segment abdominal faiblement sillonnés.

HAB. — Ile Tulagi (ma coll., type!).

12. — *P. DUPLICATA* nov. sp.

(*P. Staudigeri* KERR. i. l.)

Long. 29-35 ; larg. 10-13 mill.

Faciès se rapprochant de celui de *P. helopioides* BOISD. et des espèces affines, mais avec les côtes élytrales doublées, c'est-à-dire avec tous les interstries relevés en côtes étroites, mais les alternes un peu moins saillantes et non continues jusqu'au sommet, plus nettes et plus régulières que chez les *P. Lorquini* SAUND. et *Girardi* H. DEYR.

Robuste, convexe et gibbeux en dessus, très déclive en avant et en arrière, le dessous, vu de profil, formant un arc subparallèle à la ligne arquée du dessus, vert, vert cuivreux ou noir en dessus, les exemplaires verts avec le sommet des élytres cuivreux brillant; le dessous vert ou vert doré pulvérulent de blanc avec, sur les côtés des quatre derniers segments abdominaux, une profonde impression pulvérulente de jaune orangé.

Tête étroite, impressionnée en triangle en avant; antennes allongées, testacé clair, avec les deux premiers articles de la nuance du dessus, verts, vert-doré, cuivreux ou noirs. Pronotum penché en avant, trapézoïdal, de la largeur de la tête en avant et de celle des élytres en arrière; la marge antérieure et la base bisinuées; les côtés convergents vers l'avant, obliquement atténués en ligne droite depuis le 5° de la base jusqu'au sommet, parallèles depuis ce 5° jusqu'à la base; le disque avec cinq sillons longitudinaux dont le médian plus profond et un peu plus large que les discaux, et les prémarginaux plus larges, moins nets et moins pro-

fonds et n'atteignant pas le sommet; la surface couverte de quelques points, plus épais sur les côtés que sur le disque. Ecusson petit, en trapèze. Elytres subgibbeux, obliquement tronqués à l'épaule avec un calus saillant au bas de la troncature, subsinueux et subparallèles sur les côtés depuis ce calus jusque vers le milieu, atténués ensuite en arc peu tendu et fortement dentelés jusqu'au sommet; la surface couverte de stries profondes, linéaires sur le disque et ponctuées sur les côtés, les interstries alternativement prolongés jusqu'au sommet, les interstries 3, 5 et 7 plus larges, plus saillants et plus allongés que les autres. Dessous lisse, à très fine ponctuation largement et irrégulièrement espacés; milieu du prosternum et du premier segment abdominal vaguement déprimés; une large et profonde dépression de chaque côté des quatre derniers segments; le dernier, ♂ anguleusement échancré, ♀ en ogive avec une très petite échancrure terminale; tarses concolores.

HAB. — Nouvelles-Hébrides.

13. — *P. MEECKI* nov. sp.

Long. 18; larg. 6 mill.

Allongé, les côtés parallèles, atténué en avant et en arrière, plan en dessus, les dessous convexe noir bronzé, brillant, légèrement violacé; les antennes noires et les tarses testacés.

Faciès de *P. Clotildae* GESTRO, mais avec les fossettes latérales du pronotum et les discales des élytres moins grandes, des stries et parfois les interstries élevés en côtes bien marquées sur les élytres, et la coloration obscure, presque noire.

Tête assez large, les yeux saillants en dehors; front creusé, l'excavation longitudinalement sillonnée; vertex finement ponctué et étroitement sillonné; antennes plus longues que la tête et le pronotum réunis. Pronotum en trapèze, $1/5$ plus large que long, plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian avancé et étroitement échancré au milieu; les côtés obliquement atténués, confluent en avant et subsinueux au milieu, légèrement échancrés avant le sommet, où se remarque un sillon transversal irrégulier et interrompu au milieu; la base faiblement bisinuée; le milieu du disque sillonné; une fossette arrondie dans chacun des angles postérieurs; la surface rugueuse, grossièrement et inégalement ponctuée. Ecusson très petit, rectangulaire, de moitié plus large que long. Elytres obliquement tronqués à l'épaule, subparallèles de là jusqu'au tiers postérieur, atténués ensuite en ligne presque droite, légèrement arquée, et dentelés jusqu'au

sommet; de part et d'autre, deux impressions irrégulières le long de la base, une fossette, près du bord, dans le lobe épipleural, sous le calus huméral, une deuxième fossette, plus grande, au tiers antérieur, sur le cinquième interstrie, et une troisième fossette au tiers postérieur, aussi grande que la deuxième et située sur le septième interstrie; la surface irrégulièrement striée, les stries formées par de gros points inégaux; les interstries plus ou moins saillants, les alternes et le sutural parfois plus saillants que les autres. Dessous plus finement pointillé dans les dépressions abdominales et le long de la base des segments abdominaux que sur le reste de la surface qui est plus lisse et à points plus épais et inégalement espacés; milieu du prosternum concave et grossièrement ponctué.

HAB. — Australie : Queensland; Nouvelle-Guinée; Nouvelle-Calédonie (coll. THÉRY, ma coll., types !).

14. — CYPHOGASTRA TAITINA nov. sp.

Long. 29-38 ; larg. 8-11 mill.

Allongé, très acuminé en arrière, d'un beau vert de laque clair en dessus, légèrement doré sur le pronotum, les élytres étroitement bordés, le long de la marge extérieure et à l'extrême apex, de cuivreux pourpré sombre; dessous cuivreux pourpré sombre, mais brillant. Antennes et tarses testacé clair.

Faciès et coloration de *C. auripennis* SAUND., des îles Marianes, quant au dessus, la ponctuation élytrale tout aussi fine, mais l'apex plus acuminé et accosté extérieurement de deux ou trois dents; la coloration du dessous entièrement différente.

Tête à ponctuation fine et très espacée; front creusé en triangle, profondément et étroitement sillonné dans le fond. Pronotum rectangulaire, un peu plus large que long, les angles antérieurs obliquement tronqués; la marge antérieure bisinuée, avec le lobe médian avancé et échancré; les côtés parallèles et légèrement cintrés en dedans; la base faiblement bisinuée, avec un large lobe médian peu arqué; le milieu du disque sillonné; les côtés avec une large et profonde impression onduleuse; la surface couverte de points très fins, largement et inégalement espacés; la partie comprise entre le bord et les dépressions latérales grossièrement vermiculée avec quelques gros points inégaux. Ecusson petit, rectangulaire. Elytres subsinueux à la base, obliquement tronqués à l'épaule, finement rebordés sur toute la marge latérale, très acuminés au sommet; la surface lisse, couverte de séries de points très fins, un peu plus épais que ceux

du pronotum. Dessous très rugueux, assez grossièrement chagriné; milieu du prosternum profondément sillonné; pièces latérales du prosternum grossièrement vermiculée entre de gros points inégaux et irréguliers.

HAB. — Iles de la Société : Taïti (ma coll., type!).

15. — *C. SIMILIS* nov. sp.
(*C. Bang-Haasi* KERR. i. l.)

Long. 29-37 ; larg. 8-11 mill.

Réssemble beaucoup au précédent (*taitina*), comme lui voisin, pour le faciès, des espèces du groupe *auripennis* SAUND., des îles Mariannes, mais la coloration du dessus plus métallique, quoique légèrement cireuse; les élytres à ponctuation sensiblement plus épaisse et moins acuminiés en arrière, la dent apicale étant moins accentuée; enfin, l'épisternum prothoracique, au lieu de présenter de grosses vermiculations entre des points épais, est beaucoup plus uni, très finement et très densément ponctué.

Allongé, acuminé en arrière, tête et pronotum vert clair, un peu cireux, à légers reflets dorés; élytres verts, largement bordés de cuivreux pourpré passant ensuite au doré, avec une vague bande cuivreuse sur le disque, plus près de la suture que des côtés. Dessous cuivreux pourpré sombre éclatant; antennes et tarsi testacé clair.

Tête plus fortement ponctué en avant qu'en arrière, impressionnée en triangle et sillonnée dans le fond. Pronotum à sillon médian plus net; les impressions latérales moins profondes et moins larges. Elytres moins lisses, vaguement ridés en travers au tiers antérieur; les points plus épais et diminuant graduellement en intensité à mesure qu'ils se rapprochent du sommet: celui-ci avec cinq ou six dents inégales de chaque côté. Dessous à peu près semblable à celui du *taitina*, mais l'épisternum prothoracique beaucoup moins rugueux, presque uni.

Il est intéressant de constater l'extension des *Cyphogastra* à l'extrême orient de l'océan Pacifique, et dans une forme avoisinant celles des îles Mariannes, alors que ce genre est remplacé par les *Callistroma* aux îles Samoa et par les *Pleiona* aux îles Marquises.

HAB. — Iles de la Société : Taïti (ma coll., type).

16. — *C. EMERALDINA* nov. sp.

Long. 28; larg. 10 mill.

Faciès se rapprochant de celui de *C. simplex* KERREM., vert de laque un peu sombre en dessus avec le fond des impressions du pronotum doré; dessous d'un beau vert émeraude brillant; antennes et tarses noirs.

Tête assez inégalement ponctuée; front profondément sillonné entre deux fossettes, l'antérieure séparée de l'épistome par une carène; les yeux bordés d'un sillon inégalement ponctué. Pronotum plus large que long, bisinué en avant, faiblement échancré sur les côtés, les angles postérieurs obliquement tronqués, la troncature formant un lobe inférieur saillant et sillonné, le sillon formant le prolongement des impressions latérales, celles-ci grandes, larges, en forme de virgule et surmontée d'une fossette située contre le bord antérieur et plus près d'un large sillon médian que du côté; la surface à peine ponctuée sur le disque, et garnie de gros points sur toute la partie externe des impressions latérales. Ecusson petit, longitudinalement sillonné. Elytres obliquement tronqués à l'épaule, légèrement divergents jusque vers la moitié, atténués ensuite jusqu'au sommet avec quelques dents latéro-terminales; la surface presque lisse, sauf à la base, où se remarquent quelques gros points sur la région humérale, entre quelques plis transversaux. Dessous assez grossièrement ponctué, les points très-irrégulièrement disposés et inégaux entre eux; milieu du prosternum profondément sillonné; des reflets d'or sur les parties pointillées des segments abdominaux.

HAB. — Iles de la Loyauté (ma coll., type!).

17. — *C. AMATINA* nov. sp.

Long. 33; larg. 11 mill.

Voisin de *C. parallela* KERREM., mais plus robuste, plus largement atténué en arrière, entièrement cuivreux un peu mat en dessus avec le disque du pronotum verdâtre et l'apex obscur; le dessous cuivreux plus métallique, avec le milieu du sternum et celui des hanches postérieures vert doré, les fémurs verts à reflets cuivreux, les tibias et les tarses cuivreux métallique.

Tête creusée en avant, le front séparé de l'épistome par une carène arquée; le milieu du front profondément sillonné; un sillon profond longeant le bord interne des yeux; vertex à ponctuation fine, largement et irrégulièrement espacée. Pronotum plus large que long, rectangulaire, avec les angles antérieurs

obliquement tronqués; la marge antérieure fortement bisinuée, avec le lobe médian avancé et échancré au milieu; le sillon médian large, peu profond; les grandes impressions latérales formant de part et d'autre deux larges fossettes séparées l'une de l'autre par un relief formant le prolongement du calus formé par les angles postérieurs; ces calus grossièrement ponctués ainsi que les côtés; le milieu du disque largement et inégalement parsemé de points fins; une fossette arrondie de chaque côté du sillon médian et contre la marge antérieure. Elytres parallèles en avant, depuis la base jusqu'au tiers postérieur, arqués ensuite et atténués jusqu'au sommet; la marge latérale rebordée visible en dessus et très légèrement creusée en gouttière, la dentelure apicale usuelle remontant très peu sur les bords; la surface couverte d'une ponctuation épaisse et dense, diminuant graduellement en épaisseur depuis la base jusqu'au sommet, vaguement disposée en séries longitudinales, plus régulièrement sur deux très vagues côtes discales à peine accusées, et sensibles à cause de la régularité de la ligne de points qui les couvre. Dessous assez rugueux, très inégalement ponctué; milieu du prosternum largement canaliculé, grossièrement et inégalement ponctué dans le fond, lisse sur les bords.

HAB. — Ile Tulagi (ma coll., type!).

18. — *C. SIMPLEX* nov. sp.

Long. 32 ; larg. 10 mill.

Ressemble, pour la forme du corps, aux *C. terminalis* WATERH. et *parallela* KERREM., mais entièrement vert clair, sans reflets, plus métallique en dessous qu'au-dessus, avec quelques reflets cuivreux sur le front et l'extrême apex cuivreux sombre.

Tête et pronotum semblables, pour la sculpture et la structure, à ceux de *C. parallela*, mais le second avec les côtés plus divergents vers l'avant jusqu'à la troncature oblique des angles antérieurs, les impressions latérales plus divisées et plus étroitement rebordées sur les côtés, les fossettes antérieures bordant le sillon médian moins nettes, la ponctuation des angles postérieurs moins épaisse. Elytres à ponctuation plus fine en arrière. Dessous à ponctuation plus fine, avec les dépressions abdominales moins accentuées; le sillon du prosternum interrompu et coupé en avant par un sillon transversal et assez profond.

HAB. — Nouveau Hanovre (ma coll., type!).

19. — *C. PUNCTULATA* nov. sp.

Long. 30 ; larg. 9 mill.

Subpisciforme, le sommet des élytres à peine relevé, légèrement élargi au tiers postérieur; tête et pronotum bronzé cuivreux, largement teintés de rouge rubis en arrière, la nuance rouge remontant le long du bord en diminuant de largeur jusqu'à l'épaule; l'apex sombre. Dessous verdâtre obscur, peu brillant, plus vert au milieu que sur les côtés qui sont bronzé verdâtre. Antennes et tarses noirs.

Tête impressionnée en avant, l'impression triangulaire, à fond sillonné, le sillon mince, plus profond en avant qu'en arrière; la surface couverte d'une fine ponctuation inégalement espacée et s'épaississant en arrière sur les côtés des yeux. Pronotum subrectangulaire à peine plus étroit en avant qu'en arrière avec les angles antérieurs obliquement tronqués; le sillon médian large et peu profond; les impressions latérales grandes, coupées à angles droits sur le bord extérieur; une seule fossette antérieure, près de la marge et de part et d'autre du sillon médian; la surface presque lisse, parsemée de points très fins, largement et inégalement espacés; l'espace saillant constituant les angles postérieurs grossièrement ponctué; la partie comprise entre la troncature antérieure et la fossette marginale plus grossièrement ponctué que l'angle postérieur. Ecusson en trapèze, très atténué en avant et uni. Elytres à peine obliquement tronqués à l'épaule, divergents en ligne droite jusque vers le tiers postérieur, atténués ensuite et légèrement cintrés jusqu'au sommet; celui-ci inégalement denté; la surface grossièrement ponctué, les points plus épais en avant où ils sont séparés par des vermiculations transversales plus épaisses sur les côtés que vers la suture. Dessous finement pointillé sur les épisternums prothoraciques et dans les dépressions abdominales; celles-ci irrégulières et peu profondes; le restant de la surface avec ça et là quelques points épars.

HAB. — Ile Trobriard (?) (ma coll., type!).

20. — *C. ATRAMENTARIA* nov. sp.

Long. 40 ; larg. 12 mill.

Robuste, atténué en avant, élargi au tiers postérieur, très acuminé et relevé en arrière, pisciforme, entièrement d'un noir intense, très luisant.

Une des plus grandes espèces du genre, dont la forme du pronotum rappelle, par la structure des impressions latérales, celle des *C. Wallacei* H. DEYR., *Dohertyi* KERREM. et *Bruyni* LANSB.

Tête étroite; front très rugueux, faiblement impressionné, l'impression terminée sur le vertex par une fossette large; finement pointillé; les reliefs frontaux longitudinaux le long des yeux et inégaux au milieu. Pronotum allongé, atténué en avant, avec les angles antérieurs faiblement tronqués et échancrés; le sillon médian large et profond; les impressions latérales allongées, touchant presque les extrémités; les côtés très grossièrement ponctués et vermiculés. Elytres obliquement tronqués à l'épaule, divergents depuis la base jusqu'au tiers postérieur, très atténués ensuite et cintrés jusqu'au sommet, celui-ci très relevé, légèrement divergent et dentelé; la surface couverte de points assez épais vers la base, entre des rides formant réseau, la ponctuation devenant beaucoup plus fine à partir du tiers antérieur et diminuant de plus en plus en épaisseur jusqu'au sommet. Dessous très inégalement ponctué; sillon médian du prosternum aminci en arrière; la saillie abdominale très forte; les impressions usuelles des segments abdominaux à peine accusées.

HAB. — Nouvelle-Guinée (ma coll., type!).

21. — DICERCOMORPHA SAUNDERSI nov. sp.

Long. 23 ; larg. 9 mill.

Ressemble, pour la forme du corps, au *D. multiguttata* H. DEYR., mais plus robuste, les fossettes élytrales plus grandes; confondu avec le *D. mutabilis* SAUND., mais les fossettes élytrales plus petites et plus nombreuses, les côtés du pronotum moins dilatés et moins arqués, les impressions de celui-ci plus profondes et plus nettes.

Entièrement vert, les fossettes élytrales d'un vert argenté et garnies d'une pulvérulence blanche, le dessous vert bleuâtre.

Tête couverte de grossiers reliefs vermiculés. Pronotum plus large que long, sa plus grande largeur au milieu; la marge antérieure bisinuée, les côtés convergents en avant et en arrière; la base bisinuée; le milieu du disque profondément impressionné au-dessus de l'écusson et sillonné en avant; les côtés, vers la base, avec une dépression pointillée d'où émerge une carène sinueuse; le milieu inégalement ponctué entre des empâtements irréguliers, les côtés grossièrement vermiculés. Ecusson petit, en trapèze. Elytres transversalement impressionnés le long de la base, très légèrement élargis au tiers postérieur, atténués ensuite jusqu'au sommet; celui-ci largement tronqué de part et d'autre entre deux dents aiguës; deux côtes bien marquées sur le disque, les espaces intercostaux assez larges, avec deux rangées de

points, une contre chaque côte; une troisième et une quatrième côte, plus vagues, entre des points épais dont les intervalles forment un réseau de mailles transversales; la surface couverte de fossettes pubescentes, pulvérulentes de blanc, finement pointillés dans leur fond, inégales entre elles et irrégulièrement disposées, au nombre de 18 à 20 de chaque côté. Dessous couvert, dans les dépressions, d'une pulvérulence blanc jaunâtre; prosternum anguleusement échancré en avant, suivant un angle très obtus, entre deux lobes avancés et obtus; milieu du prosternum grossièrement ponctué; une impression irrégulière sur le côté des segments abdominaux 2, 3 et 4; milieu du premier segment déprimé entre deux carènes parallèles; pattes assez robustes; fémurs creusés le long du bord interne.

HAB. — Iles Philippines (Brit. Mus. Lond.; ma coll., types!).

22. — ECTINOSONIA FASCIATA nov. sp.

Long. 20-23 ; larg. 7-8 mill.

Ovale allongé, acuminé en arrière, d'un noir mat en dessus, les élytres avec une bande transversale au tiers antérieur et un sillon prémarginal le long du tiers postérieur, la bande et les sillons à fond cuivreux et garnis d'une pulvérulence couleur de rouille.

Tête rugueuse, largement impressionnée, l'impression limitée par le rebord des cavités antennaires, qui limitent un sillon longeant les yeux et garni d'une pubescence rousse. Pronotum en trapèze, plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée et fortement ciliée de roux: les côtés obliques et subsinueux avec les angles postérieurs légèrement saillants en dehors et aigus; le milieu du disque largement et peu profondément impressionné; la surface couverte d'une grosse ponctuation inégalement espacée, les points plus grossiers et plus rapprochés entre des reliefs vermiculés sur les côtés: dans le fond de l'impression médiane, un relief paraît former, vers l'avant, une vague carène lisse. Ecusson subcordiforme, très petit et concave. Elytres de la largeur du pronotum à la base, graduellement atténués de là jusque vers le tiers postérieur, plus brusquement atténués ensuite jusqu'au sommet: celui-ci tronqué, à peine échancré de part et d'autre entre deux courtes dents; la surface formant un réseau de mailles formées par le contour de gros points disposés en séries gémées et dont les intervalles forment quatre côtés, prolongées à travers la bande pubescente qui se remarque au tiers antérieur; l'espace compris entre la suture et la première côte creusé en gouttière et plus

finement ponctué. Dessous grossièrement ponctué; marge antérieure du prosternum sinueuse; milieu du prosternum lisse, à strie marginale entière et contournant le sommet; milieu du premier segment abdominal sillonné entre deux carènes, légèrement divergentes en arrière; pattes grossièrement ponctuées.

HAB. — Pérou (ma collection, type!).

23. — *E. PLAGIATA* nov. sp.

Long. 17-20; larg. 5,5-7 mill.

Ressemble au *fasciata* qui précède quant au faciès, en diffère par l'absence de bande pulvérulente au tiers antérieur des élytres, cette bande remplacée par une impression arrondie située de chaque côté, contre le repli épipleural et sous le calus huméral; le dessus beaucoup plus lisse, avec quelques points épars, sans vermiculations ni reliefs, tant au milieu que sur les côtés, l'impression médiane du pronotum plus nette et plus profonde; les élytres à séries de points non entourés de mailles, les interstries alternativement mais vaguement relevés en côtes entre deux séries génminées de points; le sommet des élytres obliquement tronqué de part et d'autre et inerme. Le dessous est moins rugueux, à ponctuation moins dense et moins épaisse, les côtés sont moins pubescents, enfin, le pronotum est plus arrondi, plus brusquement atténué en avant, plus parallèle et plus sinueux en arrière, avec l'angle postérieur plus saillant en dehors.

Entièrement noir, un peu luisant, les élytres avec une impression arrondie dans le repli épipleural et un sillon prémarginal longeant le tiers postérieur, remplis d'une pulvérulence couleur de rouille; dessous noir brillant, avec le fond de la ponctuation cuivreux.

HAB. — Pérou (ma collection, type!).

24. — *E. PULVEREA* nov. sp.

Long. 19-23; larg. 6-8 mill.

Faciès de l'*E. fastidiosa* FAIRM., avec la sculpture élytrale tout aussi nette et aussi régulière, noir mat en dessus avec le fond de la ponctuation couvert d'une pulvérulence blanche, le dessous vert blenâtre avec les côtés des segments abdominaux cuivreux, couvert d'une pulvérulence terreuse.

Tête grossièrement et inégalement ponctué, déprimée avec une grosse carène granuleuse et longitudinale. Pronotum plus large que long, arrondi sur les côtés en avant, subparallèle en arrière, les côtés grossièrement crénelés, les angles postérieurs

aigus, saillants en dehors et dépassant un peu les élytres; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian avancé et subanguleux; le milieu du disque largement et profondément impressionné, le fond de la dépression grossièrement et inégalement ponctué, ses bords larges et ponctuels, limitant en dehors une impression allongée. Ecusson très petit, un peu plus large que long. Elytres un peu plus étroits que le pronotum à la base, très légèrement convergents jusqu'au tiers postérieur, atténués de là jusqu'au sommet, celui-ci obliquement tronqué avec une dent suturale interne plus forte que l'externe; la surface couverte de quatre côtes lisses et entières, les espaces intercostaux larges, inégalement ponctuels et limités de part et d'autre par une rangée de gros points longeant les côtes. Dessous grossièrement vermiculé entre de gros points irréguliers; marge antérieure du prosternum échancrée entre deux saillies obtuses; milieu du prosternum plan, grossièrement et densément ponctué; milieu du premier segment abdominal sillonné.

HAB. — Chili (ma coll., type!).

25. — *E. CATENULATA* nov. sp.

Long. 14,5; larg. 5,5 mill.

Faciès du *verrucifera* FAIRM. et GERMAIN, mais plus petit, d'un bronzé clair et un peu mat, sauf sur les reliefs qui sont plus lisses et plus brillants, les côtes élytrales beaucoup moins nettes, les points des espaces intercostaux plus fins, plus rapprochés et plus réguliers; le dessous cuivreux à reliefs moins épais.

Tête déprimée en avant et grossièrement vermiculée en arrière, couverte d'une pubescence grise. Pronotum plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure fortement bisinuée; les côtés régulièrement arrondis en avant et parallèles en arrière, avec la marge latérale inégalement crénelée; l'impression discale allongée, finement granuleuse et mate dans son fond, la carène médiane très fine et visible seulement vers la base, le bourrelet qui l'entoure lisse, à fine ponctuation largement et inégalement espacée; l'impression prémarginale finement granuleuse et mate avec quelques reliefs lisses, déchiquetés, plus nombreux dans les angles postérieurs; la première côte discale courte, ne dépassant pas le tiers antérieur, vaguement prolongée suivant une série de reliefs peu accentués; la deuxième côte discale un peu plus longue que la première; la troisième aussi courte que celle-ci, non prolongée en reliefs; les espaces intercostaux ou leur prolongement limités par deux

séries régulières de points fins et rapprochés. Dessous couvert de points aciculés entre de vagues reliefs, vermiculés, ces points plus épais et plus arrondis sur le sternum que sur l'abdomen; marge antérieure du prosternum échancrée entre deux courtes saillies aiguës; prosternum plan, grossièrement ponctué; milieu du premier segment abdominal largement déprimé, la dépression vaguement prolongée sur le deuxième segment.

HAB. — Chili : Conception (ma collection, type !).

26. — *E. CURTULA* nov. sp.

Long. 12 ; larg. 4,2 mill.

Voisin de l'*E. americana*, mais moins atténué en arrière, plus largement arrondi du sommet au quart postérieur; noir brillant en dessus, bronzé clair en dessous avec les tarses bleu d'acier, les bords antérieurs du pronotum plus dilatés, l'impression médiane plus courte et plus rapprochée de la base. Sensiblement plus petit. Les stries élytrales plus nettes sur le disque, les côtés du pronotum et ceux des élytres couverts d'une pulvérulence ocrée, le dessous couvert, sur les côtés, d'une pubescence grise, retenant une pulvérulence ocrée.

Tête couverte de reliefs vermiculés minces; antennes noires. Pronotum plus large que long, bisinué en avant, les côtés largement arrondis en avant et sinueux en arrière avec les angles postérieurs petits et légèrement saillants en dehors; le milieu du disque avec une impression arrondie contre la base et prolongée en sillon linéaire en avant; le disque convexe, les côtés largement déprimés et pubescents avec les bords latéraux vermiculés, le restant de la surface couvert de points inégalement espacés. Ecusson très petit. Elytres de la largeur du pronotum à la base, parallèles sur les côtés jusque vers le quart postérieur, ensuite atténués en arc jusqu'au sommet; la surface couverte de stries à points inégaux avec çà et là quelques espaces finement pointillés, tout le côté formant, de part et d'autre, à une certaine distance du bord, une large bande irrégulière, déciquetée, finement pointillée et couverte d'une pubescence grise retenant une pulvérulence ocrée. Dessous finement granuleux et ponctué; marge antérieure du prosternum subsinueuse, sans saillies; prosternum aplani, grossièrement ponctué; milieu du premier segment abdominal sillonné.

HAB. — Argentine : bords du rio Salado (ma collection, type!).

27. — E. ARGENTINÆ nov. sp.

Long. 13-19 ; larg. 4,5-6 mill.

Oblong ovale, les côtés parallèles, arrondi en avant et atténué en arrière, vert en dessus, les elytres parfois à reflets cuivreux, couverts de larges marbrures transversales, à fond finement pointillé et couvertes d'une pubescence grise retenant une pulvéruence jaunâtre; antennes cuivreuses; dessous vert à reflets cuivreux, pattes vertes, tarses bleu d'acier, les côtés couverts d'une pulvéruence grise retenant une pulvéruence jaunâtre; les segments abdominaux 2, 3 et 4 avec un petit relief lisse, irrégulier, émergeant de la pubescence et situé à une certaine distance du bord. — Long. 19 mill.

Tête couverte de fines vermiculations entre de gros points serrés avec, en arrière, un relief irrégulier, lisse. Pronotum plus large que long, plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure bisinuée; les côtés arqués, leur plus grande largeur au milieu, sinués en arrière avec l'angle postérieur aigu et légèrement saillant en dehors; le milieu du disque avec une impression contre la base et non prolongée en avant; une impression le long du bord antérieur, non prolongé au milieu, et une autre, oblique, contournant le disque; la surface couverte, sur les côtés, de gros points épais et confluent et sur le disque de quelques points épars. Ecusson très petit, subrectangulaire. Elytres de la largeur du pronotum à la base, parallèles sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, ensuite obliquement atténués en arc jusqu'au sommet; celui-ci avec une dent suturale aiguë; la surface couverte de séries de points interrompues par des impressions marbrées, transversales, formées par des fossettes confluentes. Dessous très inégalement et moins grossièrement ponctué sur l'abdomen que sur le sternum; marge antérieure du prosternum légèrement échancrée en arc, sans saillies dentiformes; prosternum plan, grossièrement et densément ponctué; un relief lisse sur le côté des segments abdominaux 2, 3 et 4, à une certaine distance du bord.

Plus petit, entièrement vert avec les marbrures élytrales relativement plus grandes. — Long. 13 mill. — Var. *nana*, nov. var.

HAB. — Argentine : bords du rio Salado (ma coll., type!).